

微创时代开启-攀枝花市中心医院心脏中心先心病治疗


2016-04-01原文

攀枝花市中心医院作为攀西地区小儿先天性心脏病救治的唯一指定单位，承担了攀西地区先天性心脏病患者筛查、诊疗工作。根据患者病情特点，对符合条件患者选择内科介入治疗或是外科手术治疗。我院从2005年在攀西地区率先开展先心病治疗，目前心脏内、外科每年治疗先天性心脏病手术近200余台。



什么是先心病？

先天性心脏病是出生时即存在的心脏、血管结构和功能上的异常，由胚胎心脏血管在母体内发育有缺陷或部分发育障碍所造成。包括：房间隔缺损，室间隔缺损，动脉导管未闭，法洛氏四联征等。



其临床表现主要取决于畸形的大小和复杂程度。一般常见的症状包括：1、反复感冒，感冒后不易痊愈。2、生长发育比同龄儿童差。3、吃奶时吸吮无力、喂奶困难，或婴儿拒食、呛咳。4、儿童易疲劳，体力差。5、严重者口唇、指甲青紫、杵状指。6、喜欢蹲踞、晕厥。7、听诊发现心脏有杂音。早期及时准确的治疗，可恢复至正常人身体状况。如果延误治疗，可影响生长发育，导致心力衰竭、心律失常。栓塞，甚至危及生命。




先心病怎么治疗呢？

先心病治疗尚无有效药物治疗。目前的治疗手段主要依靠内科介入手术或是外科手术。

这两种手术采用什么方式呢？

内科介入治疗主要是通过血管送入先心病封堵伞，堵住缺损部位。它的优点：手术创伤小，住院时间短，身体恢复快，无肉眼可见的伤疤。只要具有合适的适应症，建议首选内科介入手术。但对于部分复杂先心病及不符合封堵条件的患者，经医生诊断后可以进行外科手术。



内科介入封堵后效果

先心病什么时候治疗最合适呢？

先心病的治疗原则是早发现、早诊断、早治疗、早恢复。一般来说肺动脉瓣狭窄和动脉导管未闭越早治疗越好。房间隔缺损应在学龄前5岁左右。室间隔缺损最好在3岁左右。具体治疗时机请咨询医生。

怎样到医院就诊呢？

中心医院每周三有先心病专家门诊，平常可以选择心脏专家门诊咨询。也可以致电：0812-2238302。

精选留言

暂无...