消化内科开展成人PICC置管术

2017-04-14原文

2014年我院肿瘤血液科率先在攀西地区开展了成人PICC置管术，此技术在我院开展已相当成熟。在此基础上，今年3月，消化内科普外二病区也成功开展了科室内首例超声引导下PICC穿刺置管术，是继肿瘤血液科之后第二个开展成人PICC的科室。

3月22日，一名乳腺癌术后患者需要进行第一个疗程的化疗，当天上午在PICC穿刺室，我科四川省静脉治疗专科资质护士从血管评估、选择到置管，整个操作一气呵成，患者感觉良好，满意度非常高，置管当天便顺利开始了化疗。

攀枝花市中心医院

攀枝花市中心医院

PICC，即经外周静脉穿刺中心静脉置管 peripherally inserted central catheter，特别适用于输入化疗、刺激性、毒性药物、缺乏外周静脉通路等病人，上腔静脉血流速度快，可以迅速冲稀化疗、毒性药物及刺激性药物，防止药物对血管的刺激，极大地保护了血管，减轻了患者痛苦。

PICC与CVC相比具有具有穿刺危险性小、并发症少、留置时间长等优点。如果要进行几个疗程的化疗，每个疗程均需要穿一次CVC，患者苦不堪言，而PICC穿刺血管选择范围较大，穿刺成功率高，导管管壁光滑，非常柔软，不宜折断,穿刺部位肢体活动不受限制，患者生活习惯基本不受影响，其留置时间可长达数月至一年，真正实现了静脉输液全程“一针疗法”，安全，快捷，有效。



消化内科首例PICC的成功穿刺，标志着本科专科护理技术迈上了一个新台阶，在此基础上，我们会努力将此项技术不断推广，以造福更多的患者！

精选留言

暂无...