

牙疼也可能要住院手术，口腔颌面间隙感染不容忽视！

口腔科

2021-06-21原文





一颗娃娃菜带你了解 口腔颌面间隙感染

攀枝花市中心医口腔科

点击图片可放大阅览



我有间隙!



巧了，我也有间隙!

口腔颌面间隙：

口腔颌面部，颅底、上下颌骨的骨筋膜间、筋膜与肌肉间、肌肉与骨膜间、骨膜与骨膜间存在一定潜在间隙。正常情况下，这些间隙中充填着疏松结缔组织，有的间隙还有神经、血管穿行，从而使相邻的间隙彼此通连。

就像娃娃菜一样，每一片叶子之间都存在着一定的间隙，满足其正常生长。



当感染侵入这些间隙时，化脓性炎症使疏松结缔组织溶解液化，炎症产物充满其中，此时才出现明显的间隙，局部表现会有肿胀、疼痛及功能障碍的表现。当炎症感染时，可循此途径蔓延，脓液也可溃破筋膜，扩散到邻近的间隙。



惨了，我中招了。
(T-T)

什么是口腔颌面间隙感染？



早期



轻者无明显全身症状，重者高热、寒战、脱水、白细胞增高、食欲不振、周身不适。



持续发展



局部表现为发红、肿胀、皮温高、疼痛，涉及咀嚼肌的间隙感染，有张口受限，位于舌、口底、咽旁者则出现进食、吞咽或呼吸困难。



严重并发症



腐败坏死性感染者，全身中毒症状严重：水电紊乱，败血症，脓毒血症，严重肺部感染，颅内感染，甚至死亡。



感染位置不同
表现各不相同

发生在浅层间隙感染者，局部体征极为明显，可见颌面部肿胀严重，可扪及波动感。发生在深层间隙感染者，局部体征多不明显，颌面部肿胀较轻，可有局部有凹陷性水肿。

感染扩散至咽旁间隙者，肿胀严重以至于压迫气管时，患者可出现呼吸困难、面色发绀等症状。



感染扩散至舌下间隙者，患者出现舌下肿胀、舌部运动障碍，出现吞咽困难。

全身治疗：全身抗菌对症治疗。

局部处理：局部脓肿形成后切开引流。



如何
治疗



全身治疗：

一般支持疗法与抗生素治疗，控制感染。

局部治疗：

炎症局限形成脓肿，应及时进行切开引流术。

去除病因：

病情稳定后，及时处理病灶牙，拔除无保留意义的患牙。



减轻局部肿胀、疼痛及张力，缓解对呼吸道和咽腔的压迫，避免发生窒息。



使脓液、坏死感染物迅速排出，减少毒素吸收。

为什么要切开引流



为什么要切开引流



防止感染向邻近间隙蔓延，防止向颅内、纵隔和血液扩散，避免严重并发症。



牙源性感染，如智齿冠周炎、根尖周炎等是口腔颌面间隙感染最主要、最常见的病因，因此口腔颌面间隙感染的预防，也是口腔牙病的预防。



病例 1



梅某，男，65岁，因残根牙反复疼痛5天，颌面部肿胀、呼吸困难2天入院.....

病例 2




李某，女，27岁，孕27+4天，因右下后牙区疼痛（智齿冠周炎）伴右颌面部及颌下肿胀、吞咽困难5天，加重伴呼吸困难2天入院.....

病例 3



罗某，男，9岁，因乳牙龋坏疼痛伴颌面部肿胀3天入院.....



有效清洁牙齿

正确刷牙，选择合适的牙膏及牙刷；
使用牙线，有效清洁牙缝隙食物残渣；




定期牙保健

建议半年一次口腔保健检查，祛除牙结石及牙菌斑；
加强龋齿的预防及早期处理；



切莫讳疾忌医

出现牙痛、面部肿胀、开口受限等尽早正规治疗；
尽早拔除无保留价值的智齿、残根牙等；



让我们守住健康“大门”
关注口腔间隙感染
做好预防与保健

攀枝花市中心医院口腔颌面外科具有国内先进的口腔颌面间隙感染治疗技术，丰富的诊治经验，重症口腔颌面间隙感染患者的收治率和治愈率在攀西地区位居首位，我们全体医护人员一直在为您的口腔健康保驾护航！




攀枝花市中心医院口腔科联系电话：0812-2238253



END

供稿：夏志敏（口腔科）

编辑：院党办



扫码关注我们

攀枝花市中心医院
官方微信



扫描二维码，关注我的视频号

扫码关注我们

攀枝花市中心医院
官方视频号

精选留言

暂无...