

哇哦！耳背“克星”！市中心医院老年科的沟通“神器”了解下

老年科

2022-03-25原文



护士小姐姐：马冬梅

患者：马什么梅

护士长：马冬梅

患者：什么冬梅

值班医生：马冬梅

患者：马东什么

清扫大姐：马冬梅啊

患者：我记住了

什么来着？ 孙红雷？



相信大家都看过《夏洛特烦恼》里的这一段

这可不是单纯的段子

这是咱们攀枝花市中心医院老年科的日常

护士：王老，您吃午饭了吗？

患者：啊？我不去哪儿呀。

护士： 🤔 我是问您吃中午饭了没？
吃了多少？您需要记录出入量。

患者：哦~昨天早上吃的馒头，尿也多得很，起码有2两。

护士： 😭



护士：您氧饱和度有点低，我把氧气给您吸上吧。

患者：我没吃饺子，下午在食堂买的米线

护士： 🐼



医生：刚给您听诊了下，肺上有杂音

患者：安？你说什么？

医生：我说您肺上有杂音，需要去照个X光

患者：你说我肺里在放光？

医生： 🐼



这样的情形在老年病房一点都不陌生，您也许会觉得有点搞笑，觉得不打紧，就是耳朵有点背而已，但在实际生活中，听力障碍的老人们却深受折磨。



怎么办呢？



这不，沟通“神器”来了，今年开始，攀枝花市中心医院老年科兴起了一股“小蜜蜂”扩音器的沟通风潮，广泛应用于询问病史、查房、老年综合评估、健康宣教等。此举不仅让患者更容易听清楚，而且

医务人员也不会再每天嗓子冒烟了，既让患者倍感亲切，也提高了工作效率。





下面是科普时间



大家都停下，听我说：

老年人听力障碍和危害具体表现有哪些呢？

老年人听力障碍表现

听力下降

60岁以上出现原因不明的双侧对称性听力缓慢下降。

音素衰退现象

能听到说话的声音，但内容会有误，听人说话，喜慢怕快、喜安静怕嘈杂。

听觉重振现象

低音听不见，高音又感觉刺耳难受，语言辨别力低下。

头昏、耳鸣

耳鸣常始于30~40岁，其出现率随年龄而渐增，60~70岁时达到顶点，此后即迅速下降。

老年人听力障碍危害

导致沟通障碍，影响人际关系

看见别人侃侃而谈，自己却听不清；旁人喊好几遍，都没回应，还以为对他有意见；双方聊天扯着嗓子喊，总感觉像在吵架……

引起听觉疲劳，生活越来越累

当有听力损失时，由于声信号传导受阻，或是内耳感音能力下降，实际传送给大脑的信号就减少了，大脑就必须更加“努力”根据残存信号来判断原声。

诱发焦虑、抑郁、痴呆等心理疾病

当长期与人沟通障碍，会影响其心理健康。

增加摔倒等意外伤害的风险

听力损失不仅带来聆听上的障碍，还会影响前庭系统，导致摔倒风险增加。

所以，如果家有听力障碍的老baby

我们一定要有更多耐心哟

供稿：老年科 曹大丽



扫码关注我们

攀枝花市中心医院

官方微信



扫描二维码，关注我的视频号

扫码关注我们

攀枝花市中心医院

官方视频号

精选留言

暂无...