

别不好意思！无任何不适也要注意宫颈问题！

2022-09-23原文



近日医院妇科门诊接诊了一个年轻的女病人，“啪啪”后出血来就诊，在此之前并未有任何不适，门诊行宫颈癌筛查后建议进一步做阴道镜下宫颈活检。

活检结果
提示宫颈癌

.....



提到宫颈癌
很多人会想到
最近一再断货的hpv疫苗
很多人会有疑问
注射疫苗
就可以预防宫颈癌了吗？



图片来源摄图网

要正确回答这个问题
我们要先了解一个问题

什么是宫颈癌？

宫颈癌是目前唯一病因可明确，且可早期发现、早期预防的癌症，目前研究发现95%以上宫颈癌患者存在HPV感染，因此预防和治疗HPV感染成为预防宫颈癌最重要的方法，这也是HPV疫苗火爆的原因。

HPV是一种病毒，主要通过生殖道皮肤、黏膜接触体液传播，间接接触如共用衣服、浴盆等。HPV有100多种类型，其中13-15种可导致宫颈癌。

自然界中HPV广泛存在，但并非感染了HPV即意味着患宫颈癌。

正常宫颈感染高危HPV病毒后，一般需5-10年发展为宫颈癌。如果做到定期检查、早期发现，可在成为宫颈癌之前治疗，避免进一步恶化。更重要的是HPV疫苗并不能预防所有宫颈癌，且性生活史越长，疫苗的作用越小。

要做到有效预防宫颈癌

宫颈筛查必不可少！

千万不能因为这些理由就不去



没有什么不舒服，不用检查！—

性生活很检点，不用检查！—

去医院太麻烦，不想去！—

妇科检查不好意思，不想去！—

只要我不检查 就没病



许多女性都会因为各种理由
不愿来医院做系统的妇科检查
尤其忽视宫颈的检查

其实，宫颈筛查并不复杂

只是在子宫颈管用子宫颈刷轻轻的刷几下，不会有明显的疼痛，可能会有少许的阴道出血。

主要检查的是：宫颈液基细胞学检查（TCT）和人乳头瘤病毒（HPV）DNA检测……

HPV检查检测是否感染HPV，并明确是哪种HPV病毒感染，给医生提供准确的治疗指导。



图片来源摄图网

攀枝花市中心医院妇科专家建议您 无任何不适也需要定期进行宫颈筛查

- 有性生活三年以上从未做过宫颈癌筛查；同房后出血的；月经干净后再次异常出血的情况；白带异常，有异常分泌物的女性，一定尽早进行筛查。
- 并注意检查前3天禁止性生活、禁止进行阴道检查、阴道灌洗和阴道上药等等，以避免干扰检测结果。

文章作者



牛津洋

主治医师

长期从事妇产科工作，积累了丰富的临床经验。擅长妇科各类手术，尤其妇科微创手术，如单孔及多孔腹腔镜手术和各类宫腔镜手术。参与多项市级院级科研课题研究，发表论文数篇。

👉 点击关注我们官方微信 👈



扫码关注

攀枝花市中心医院

官方微信



扫描二维码，关注我的视频号

扫码关注

攀枝花市中心医院

官方视频号

精选留言

暂无...